

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-5-70 064 259

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Régie de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative,

C. C. P. CLERMONT-FERRAND 5.503-17

CLERMONT-FERRAND - 63

Supplément n° 2 au Bulletin n° 116 de MAI 1970.-

25,00 F

A V E R T I S S E M E N T S . -

POIRIERS - POMMIERS

TAVELURES.-

Des infections primaires étant encore à redouter, il est conseillé de renouveler la protection dès que possible.

Comme précédemment, s'il y a lieu, intervenir en même temps contre l'Oïdium, les Pucerons, les Acariens (dans de nombreux vergers il peut être observé l'éclosion de la totalité des oeufs d'hiver de l'araignée rouge, *Panonychus ulmi*).

V I G N E

MILDIOU.-

Localement, les premières contaminations ont eu lieu avec les pluies du 6 au 9 Mai et quelques contaminations secondaires ont pu se produire avec les dernières pluies.

Pour éviter l'extension de ces premières attaques, il est conseillé d'effectuer, avant le 25 Mai, un traitement soigné dans les situations habituellement favorables à la maladie (situations bien connues des viticulteurs : mouillères, en particulier).

BLACK-ROT et BRENNER.-

Dans les vignes intéressées, renouveler la protection.

I N F O R M A T I O N S . -

A R B R E S F R U I T I E R S

ANTHRACNOSE DU CERISIER.-

Contre cette maladie, courant l'an dernier dans de nombreuses plantations, intervenir avec l'un des produits suivants : doguadine, folpel, oxyquinoléate de cuivre (sauf en pépinières), manèbe.

ROUILLE DU PRUNIER.-

Il est conseillé de traiter avec une spécialité à base de carbatène, de folpel, de manèbe, de mancozèbe, de zinèbe ou de zirame.

P./253

ACARIENS - PUCERONS.- (toutes essences fruitières)

Intervenir, s'il y a lieu.

B E T T E R A V E S

PEGOMYIE.- (Mouche de la betterave)

Les premières attaques peuvent être observées dans certaines cultures.

En cas d'intervention, (des attaques de Pégomyie sur jeunes betteraves peu développées peuvent être dangereuses), choisir de préférence un pesticide à la fois efficace contre la Pégomyie et les Pucerons (consulter le bulletin n° 114 de MARS).

TRAITEMENT APRES UNE CHUTE DE GRELE

En cas de dégâts par chute de grêle sur Vigne et Arbres fruitiers, il est rappelé qu'il y a intérêt à effectuer un traitement anticryptogamique dans les meilleurs délais.

Clermont-Ferrand, le 21 Mai 1970.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux :

P. DENIZET

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND

Directeur-Gérant : L. BOUYX.